



As evidências sugerem

TEMPORADA
7

EPISÓDIO #145

Encefalite anti-NMDA e psicose

VINICIUS GUAPO

A encefalite anti NMDA é uma condição que me intriga desde suas primeiras descrições, em 2007 e 2008. Apesar de rara, trata-se do diagnóstico mais comum entre as psicoses de origem autoimune e sua pronta identificação e tratamento pode significar a diferença entre a resposta terapêutica completa ou a instalação de um quadro clínico crônico e de difícil controle. Diante de um paciente, com sintomas psicóticos atípicos e indicativos de origem em uma condição médica geral ou neurológica, um dos diagnósticos diferenciais deve ser psicose autoimune e, mais especificamente, a encefalite anti NMDA.

REFERÊNCIAS:

DALMAU, J.; ARMANGUÉ, T.; PLANAGUMÀ, J.; RADOSEVIC, M. et al. An update on anti-NMDA receptor encephalitis for neurologists and psychiatrists: mechanisms and models. *Lancet Neurol*, 18, n. 11, p. 1045-1057, 11 2019.

DALMAU, J.; GLEICHMAN, A. J.; HUGHES, E. G.; ROSSI, J. E. et al. Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series and analysis of the effects of antibodies. *Lancet Neurol*, 7, n. 12, p. 1091-1098, Dec 2008.

DALMAU, J.; TÜZÜN, E.; WU, H. Y.; MASJUAN, J. et al. Paraneoplastic anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated with ovarian teratoma. *Ann Neurol*, 61, n. 1, p. 25-36, Jan 2007.

HERKEN, J.; PRÜSS, H. Red Flags: Clinical Signs for Identifying Autoimmune Encephalitis in Psychiatric Patients. *Front Psychiatry*, 8, p. 25, 2017.

POLLAK, T. A.; LENNOX, B. R.; MÜLLER, S.; BENROS, M. E. et al. Autoimmune psychosis: an international consensus on an approach to the diagnosis and management of psychosis of suspected autoimmune origin. *Lancet Psychiatry*, 7, n. 1, p. 93-108, 01 2020.

OUÇA PELA
SUA PLATAFORMA
PREFERIDA!



www.pqupodcast.com.br

