

Temporada 13

EPISÓDIO #263



VINICIUS
GUAPO

As evidências sugerem

Discinesia tardia

A discinesia tardia é um efeito colateral do uso de antipsicóticos. Trata-se de uma manifestação intrigante e, pode-se até mesmo dizer, misteriosa. Um bom psiquiatra necessita saber identificá-la o mais precocemente possível para intervir com mais chances de sucesso. Uma vez que foram disponibilizadas medicações que se propõem a tratar esta condição com maior especificidade, no episódio 263 do PQU Podcast resolvemos jogar luz neste aspecto um pouco negligenciado, a nosso ver, das consequências do uso de antipsicóticos. Vale a pena conferir!

Referências:

CRANE GE. Tardive dyskinesia in patients treated with major neuroleptics: a review of the literature. *Am J Psychiatry.* 1968 Feb;124(8):Suppl:40-8. doi: 10.1176/ajp.124.8S.40. PMID: 4865731.

WALN O, JANKOVIC J. An update on tardive dyskinesia: from phenomenology to treatment. *Tremor Other Hyperkinet Mov (NY).* 2013 Jul 12;3:tre-03-161-4138-1. doi: 10.7916/D88P5Z71. PMID: 23858394; PMCID: PMC3709416.

WHITAKER R. A short history of tardive dyskinesia: 65 years of drug-induced brain damage that rolls on and on. madinamerica.com/2020/11/tardive-dyskinesia-brain-damage



TEM
PORA
DA
13

ESCOLHA SEU APLICATIVO FAVORITO
OU ACOMPANHE O PQU PODCAST PELO SITE
E TAMBÉM NO YOUTUBE.



www.pqupodcast.com.br

